

CUERPO CENTRAL

INSECTICIDA
GRUPO 7

PIRIPROXIFEN ACTION

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición

piriproxifen: 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi)propil eter	10 g
emulsionantes y solventes c.s.p.....	100 cm ³

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA N° 41.985

Lote Nro.:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

NO INFLAMMABLE

ARANAMI INDUSTRIAL S.A.

Alvarado Lote 4 B 0 - Fighiera

Santa Fe

República Argentina

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.



Banda toxicológica de color Verde Pantone
C 347

CUERPO IZQUIERDO

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **PIRIPROXIFEN ACTION** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES

PIRIPROXIFEN ACTION es moderadamente tóxico para peces, no contaminar fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua 3 metros

PIRIPROXIFEN ACTION es prácticamente no tóxico para aves.

PIRIPROXIFEN ACTION es moderadamente toxico para abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando cercanías con centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS

Los envases vacíos no pueden volver a utilizarse. Vaciar el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora adicionar agua limpia hasta 1/4 de su capacidad y agite. Verter el enjuague en el tanque. Repetir tres veces. Perforar la base del envase para evitar su reutilización, intentando no dañar la etiqueta, y disponer en centros de acopio

en conformidad con las normas locales. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO

Mantenerlo alejado del calor y las llamas. Conservar el envase bien cerrado y etiquetado en un lugar seco, fresco y ventilado. No contaminar alimentos, forrajes ni cursos de agua.

DERRAMES

En caso de derrames, cubra el producto con un material absorbente (arena, tierra, aserrín). Barrer y recoger con una pala el material impregnado y colocar en una bolsa y la misma dentro de un recipiente. Dar aviso al personal técnico de la empresa para determinar su destino.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.

En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

CLASE TOXICOLÓGICA IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO.

Leve irritante dermal (CUIDADO). Categoría IV: Evitar el contacto con la piel y la ropa.

Corrosivo ocular (PELIGRO). Categoría I: Causa daño irreversible a los ojos

No sensibilizante dermal.

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE (todo el año, 24 horas por día):

- T.A.S. - CASAFE - Tel.: (0341) 4480077 / 4242727 ó 0800-888-TOXI (8694) - Tucumán 1544. (2000) Rosario, Santa Fe.

CAPITAL FEDERAL:

- Unidad toxicológica del Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

- Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires. Tel.: (011) 5950-8804 / 06 y (011) 5950-8000

BUENOS AIRES:

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo. Tel.: (011) 4658-7777 y (011) 4654-6648

CORDOBA:

- Hospital de Niños. Tel: (0351) 458-6400

- Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de sinergismo, aditividad o potenciación.

CUERPO DERECHO

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES

PIRIPROXIFEN ACTION contiene piriproxifen que es un insecticida que actúa como un regulador bioracional del crecimiento de los insectos, desarrollado a partir de la hormona juvenil natural (JH).

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación: Llenar el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN

LIMÓN: Aplicar con equipos de alto volumen y alta presión, con manguera y turbina hasta punto de goteo, procurando un volumen de entre 30 y 40 litros por planta.

MANZANO y PERAL: aplicar con equipos de alto volumen calculando este último en función del sistema TRV (volumen de la fila de árboles).

TOMATE: Aplicar con equipos terrestres, como mochilas a motor, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de alcanzar el envés de las hojas. Cobertura: 50 a 70 gotas cm², tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 10-20% de coeficiente de variación.

RECOMENDACIONES DE USO

No presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas en el cuadro de recomendaciones. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30°C; Humedad relativa menor de 40 %; viento mayor a 15 Kph. Agregar coadyuvantes según recomendaciones locales.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de aplicación
LIMÓN	Cochinilla roja australiana (<i>Aonidiella aurantii</i>)	30-50 cm ³ /hl	25	Aplicar el producto una vez por temporada, a la caída de los pétalos o al momento del cuaje del fruto.
TOMATE	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 - 75* cm ³ /hl	7	Aplicar el producto al observarse la eclosión de huevos (*) y/o la aparición de las primeras ninfas. Repetir a intervalos de 7 a 14 días para el control de eclosiones posteriores: Como el producto no posee acción directa sobre formas adultas o aladas, se recomienda la mezcla con un insecticida adulticida. (*) La dosis mayor presenta acción ovidicida, principalmente en huevos de 1 a 3 días de edad.
	Mosca blanca de los invernáculos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)			

MANZANO	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	30 cm3/hl	7	Realizar la aplicación en el pico de oviposición de cada generación de <i>C. pomonella</i> (de acuerdo a las lecturas de trampas de adultos) en mezcla con Assail (Acetamiprid 5gr/hl) a intervalos de 14 días, con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.
PERAL	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	30 cm3/hl	28	

(*) A las dosis mayores, el producto manifiesta actividad ovicida, principalmente en huevos de 1 a 3 días de edad.

RESTRICCIONES DE USO

Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs.

Período de carencia: Manzano y Tomate: 7 días. Limón: 25 días. Peral: 28 días.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de limón, manzano, pera y tomate; sin embargo se recomienda realizar una prueba de fitocompatibilidad química y biológica de cualquier mezcla que se intente hacer, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

FITOTOXICIDAD

No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.